

## Листок-вкладыш: информация для пациента/потребителя

### Стопдиар 200 мг капсулы

*Nifuroxazidum*

**Полностью и внимательно прочитайте этот листок-вкладыш перед началом приема препарата, поскольку он содержит важную информацию для вас.**

Всегда применяйте данный препарат, в соответствии с показаниями в этом листке-вкладыше или назначениями вашего врача, или фармацевта.

- Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Обратитесь к фармацевту, если вам нужна дополнительная информация или рекомендации.
- Если у Вас возникнет какой-либо побочный эффект или Вы заметите побочные эффекты, не указанные в этом листке-вкладыше, сообщите об этом Вашему лечащему врачу или фармацевту. См. п.4
- Если вы не чувствуете себя лучше или чувствуете себя хуже после 3 дней, вам следует обратиться к врачу.

**Данный листок-вкладыш содержит следующую информацию:**

1. Что такое Стопдиар и для чего его применяют
2. Что следует знать до начала приема Стопдиара
3. Как следует принимать Стопдиар
4. Возможные побочные эффекты
5. Как следует хранить Стопдиар
6. Содержимое упаковки и другая информация

#### **1. Что такое Стопдиар и для чего его применяют**

Стопдиар это антибактериальный препарат. Он оказывает местную антибактериальную активность на некоторые виды бактерий в просвете кишечника.

Стопдиар не выводит патогенные бактерии, которые появляются должным образом в желудочно-кишечном тракте. Это лекарство не вызывает образование устойчивых к нифуроксазиду бактериальных штаммов. Этот препарат практически не абсорбируется из желудочно-кишечного тракта после перорального применения. Он выводится как неизменный препарат с фекалиями.

**Стопдиар используется для лечения следующих заболеваний и расстройств:**

- Острая и хроническая диарея бактериального происхождения
- Другие болезни, сопровождающиеся диареей

#### **2. Что следует знать до начала приема препарата Стопдиар**

**Не принимайте Стопдиар**

- Если у Вас аллергия к нифуроксазиду или к любым вспомогательным веществам препарата (перечисленные в пункте 6). Аллергическая реакция может проявиться как отек лица, губ, языка или отсутствие воздуха (при возникновении любого из этих симптомов вам следует немедленно обратиться к врачу).
  - Для детей в возрасте до 7 лет, потому что дети до этого возраста могут иметь проблемы с глотанием капсул.

#### **Предупреждения и меры предосторожности**

Перед тем, как принять Стопдиар, обратитесь к вашему врачу или фармацевту:

- Если диарея длится более 3 дней, несмотря на применение Стопдиара, вам следует обратиться к врачу. Ваш врач проведет тесты, чтобы определить причину симптомов и для определения продолжительности лечения.

- В случае аллергических реакций с такими симптомами, как сыпь, зуд, прием Стопдиара следует прекратить.
- Стопдиар следует принимать, соблюдая диету, исключая сок, сырые овощи и фрукты, также острую и тяжелую пищу, а также замороженные продукты или очень холодные напитки.
- Постоянная дополнительная гидратация (пероральная или внутривенная) требуется при лечении диареи, в зависимости от общего состояния пациента (среднесуточное потребление воды для взрослого человека 2 литра) для компенсации потери жидкости из-за диареи. Внутривенную гидратацию следует рассматривать при тяжелой и продолжительной диарее, рвоте.

### **Другие лекарственные средства и Стопдиар**

Уменьшает всасывание многочисленных препаратов из желудочно-кишечного тракта. Если вы принимаете другие лекарства, вам следует обратиться к врачу, прежде чем начать принимать Стопдиар.

### **Стопдиар с пищей и напитками**

Употребление пищи следует поддерживать на протяжении всего периода диареи, за исключением определенных продуктов, в частности соки, сырые овощи и фрукты, пряные и тяжелые для пищеварения продукты, а также замороженные пищевые продукты и холодные напитки. Рекомендуется есть жареное мясо и рис.

Прием алкоголя при применении Стопдиара может вызвать острую и серьезную реакцию непереносимости (так называемые дисульфирамоподобные реакции).

### **Беременность и грудное вскармливание**

*Если Вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что беременны или планируете забеременеть, сообщите об этом врачу или фармацевту для рекомендаций до начала применения этого препарата.*

Стопдиар следует с осторожностью применять беременным и кормящим женщинам.

### **Управление транспортными средствами и работа с механизмами**

Стопдиар не влияет на способность управления транспортными средствами и работы с механизмами.

Стопдиар содержит сахар. Если ваш врач сказал вам, что вы не переносите некоторые категории сахаров, обратитесь к врачу, прежде чем принимать это лекарство.

## **3. Как следует принимать Стопдиар**

Всегда применяйте данный препарат, строго соблюдая назначения врача. Если вы не уверены, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом или фармацевтом.

- Обычная доза для взрослых и детей старше 7 лет составляет 1 капсулу 4 раза в день, каждые 6 часов.
  - Стопдиар принимают внутрь. **Капсулы следует проглатывать целиком**, с достаточным количеством жидкости, например стаканом воды.
  - Вы должны сообщить вашему врачу, если ваши симптомы ухудшаются или не улучшаются через 3 дня.
  - Стопдиар не должен приниматься более 3 дней без консультации с врачом.
  - Требуется постоянная гидратация при лечении острой диареи со Стопдиаром. Вы должны употреблять много жидкости, сладкие и соленые напитки, чтобы компенсировать потерю жидкостей из-за диареи (среднесуточное количество воды для взрослого составляет 2 литра). Внутривенную гидратацию следует рассматривать при тяжелой и продолжительной диарее, сильной рвоте или анорексии.
- Если вы чувствуете, что эффект Стопдиара слишком силен или слишком слабый, поговорите

со своим врачом.

#### **Если Вы приняли больше Стопдиара, чем назначено**

Если Вы приняли больше Стопдиара, чем рекомендуемая доза, обратитесь немедленно к врачу. Вы должны показать вашему доктору упаковку с капсулами Стопдиар, которые принимали.

#### **Если Вы забыли принять Стопдиар**

Следующая доза должна приниматься в обычное время. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

#### **Если Вы прекратили прием Стопдиар**

Вы не должны прерывать лечение до истечения трех дней, даже если вам будет лучше.

Если у Вас возникнут дополнительные вопросы о применении этого препарата, обращайтесь к вашему врачу или фармацевту.

#### **4. Возможные побочные эффекты**

Как и все другие лекарственные препараты, Стопдиар может вызвать побочные эффекты, однако они возникают не у всех пациентов.

Не зарегистрировано никаких серьезных побочных эффектов, которые могут быть опасными для жизни после лечения Стопдиар, за исключением случая гранулоцитопении (значительное уменьшение количества определенного типа лейкоцитов - гранулоцитов).

В отдельных случаях аллергическая реакция на нифуроксазид может включать следующие побочные эффекты:

- Боль в животе
- тошнота
- усиление диареи

Кроме этого, следующие *побочные эффекты встречаются редко (менее чем у 1 из 10000, но меньше, чем у 1 из 1000 пациентов)*

- Сыпь
- Прыщи на коже
- Зуд и узелки на коже

Возможны следующие побочные эффекты, но их частота не может быть оценена по имеющимся данным (неизвестная частота): аллергические реакции, такие как кожная сыпь, крапивница, ангионевротический отек, анафилактический шок.

#### Сообщение о побочных эффектах

При возникновении любых побочных эффектов, в том числе и не упомянутых в данном листке-вкладыше, обратитесь к врачу или фармацевту.

Так же, вы сможете сообщать о любых побочных эффектах напрямую через национальную систему регистрации побочных эффектов лекарственных средств, подробная информация о которых опубликована на сайте Агентства по Лекарствам и Медицинским Изделиям по следующему веб-адресу: [www.amed.md](http://www.amed.md) или e-mail: [farmacovigilenta@amed.md](mailto:farmacovigilenta@amed.md).

Сообщая о побочных эффектах, Вы оказываете содействие в предоставлении большей информации по безопасности данного лекарства.

#### **5. Как следует хранить Стопдиар**

Хранить в недоступном для детей месте.

Препарат не требует особых условий хранения.

Не принимайте этот препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке и блистере, после expirã. Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.

Лекарственные средства не следует выбрасывать в бытовые отходы или сточные воды. Если необходимо удалить в отходы препарат, который больше не нужен, проконсультируйтесь с фармацевтом. Эти меры помогут предотвратить загрязнение окружающей среды.

## **6. Содержимое упаковки и другая информация**

### **Что содержит Стопдиар**

Действующее вещество: нифуроксазид.

Вспомогательные вещества: кукурузный крахмал, прежелатинизированный кукурузный крахмал, сахароза, стеарат магния, желатин, диоксид титана (Е 171), желтый оксид железа (Е 172).

### **Внешний вид Стопдиара и содержимое упаковки**

Стопдиар представляется в виде твердых желатиновых капсул, желтого цвета.

Капсулы доступны в картонных коробках по 12 капсул в блистерах из ПВХ / Ал.

### **Владелец регистрационного удостоверения и производитель**

#### **Владелец регистрационного удостоверения**

Гедеон Рихтер, ОАО,  
ул. Демреи 19-21, 1103 Будапешт,  
Венгрия.

#### **Производитель**

Gedeon Richter Polska Sp.zo.o.  
ul. ks.J.Poniatowskiego 5  
05-825 Grodzisk Mazowiecki  
Польша.

### **Этот листок-вкладыш был утверждён в марте 2019**

Подробная информация об этом лекарстве доступна на веб-сайте Агентства по Лекарствам и Медицинским Изделиям (АЛМИ) <http://nomenclator.amed.md/>